



후기비대와 착색, 당도를 동시에 증진하는 업그레이드 착색증진제



슈가엔칼라 LX



특징 및 효과

1. 본제품은 후기 열매 비대와 당도, 착색증진에 효과적인 기능성 물질을 배합하여 만들어진 생리활성제입니다.
2. 온도가 너무 높거나 일조량 부족, 과다한 착과, 수세가 너무 약할 때 등 환경적인 조건이나 나무상태로 인한 당도 착색 불량을 개선하는데 큰 도움을 줍니다.
3. 과일의 성장 메커니즘에 맞게 생리활성을 자극하여 자연스럽게 당도와 착색을 증진시키며 무르거나 저장성이 떨어지는 등의 부작용 및 작물세력저하로 인한 조기낙엽이 없습니다.
4. 과일의 당도를 증진하는데 필요한 다양한 폴리사카라이드 및 착색을 증진하는 아미노산 전구체가 풍부하게 함유되어 자연스러운 안토시아닌 합성과 축적에 도움이 됩니다.
(과채류나 화훼류에 함유된 붉은색소인 안토시아닌은 적색과 보라색을 띠는데 중요한 성분입니다.)

주요활성성분

폴리사카라이드 60%
기능성 아미노산 15%
유기산 1.2%
식물성 착색증진효소

사용방법

대상작물	사용시기	사용량	사용횟수
사과, 포도, 복숭아, 오미자등 과수류	착색이 시작되는 초기	500~1000배로 희석하여 엽면시비	7~14일 간격으로 2~3회시비
딸기, 고추, 토마토, 수박, 가지등 과채류	비대기 이후	500~1000배로 희석하여 엽면시비	7일 간격 2회
		1L/200평 관주시비	
적상추, 로메인등 엽채류	잎색이 잘 나오지 않을 때	500~1000배로 희석하여 엽면시비	7일 간격 2~3회

슈가엔칼라-LX 실험사진



처리전



500배차
처리 후
7일



500배 2차
처리 후
7일



500배 3차
처리 후
7일

주의사항

1. 희석배수 500~1000배를 준수하여 주시고 강한 농도로 사용하지 마십시오.
강한농도는 색은 빨리 나지만 열매가 잘 크지 않을 수 있습니다.
2. 엽면시비와 관주시비를 병행하면 더욱 효과적입니다.
3. 작물성장에 필요한 비료는 해당 작물생육에 맞게 적절하게 공급해주셔야 합니다.
4. 농약이나 기타 영양제와 혼용 가능합니다만 소규모테스트를 권장합니다.

기능성 생리활성제